

CALIFORNIA AVENUE SCHOOL
215 W. California Avenue
Vista, CA 92083
760-630-4870

**GUIA PARA MANTENER EN CASA
A SU HIJO/A DE LA ESCUELA.**

- ❑ Una fiebre de 100 grado o más, emparejado con un sarpullido, el dolor de oídos, garganta adolorida, la lentitud o la náusea. Una fiebre puede señalar una infección sumamente contagiosa. Mantenga en casa hasta que la fiebre liberte durante 24 horas. Dé sólo Tylenol (paracetamol). **Nunca dé aspirin** a un niño bajo 19 años de la edad.
- ❑ Una tos persistente y productiva y resollando emparejado con una descarga gruesa o constante nasal.
- ❑ Un sarpullido no diagnosticado, especialmente cuando hay una fiebre y el cambio conductista.
- ❑ La conjuntivitis, en que hay una descarga blanca o amarilla, a menudo con párpados enredados después del sueño, el dolor de ojo y rojez.
- ❑ Piojos - Mantiene en casa hasta que sea tratado y todas liendres sean quitadas. Notifique a la enfermera de escuela para que pueda verificar las cabezas de otros compañeros de clase.
- ❑ La viruela - Mantiene en casa hasta que todos las ampollas se postillan y secan.
- ❑ La diarrea o vomitando más de una vez o acompañado de la fiebre, el sarpullido o la debilidad general.
- ❑ El impétigo - Mantiene en casa por 24 horas después de empezar el tratamiento antibiótico.
- ❑ La tiña (la infección contagiosa del hongo) Mantiene en casa hasta que el tratamiento se empiece. La tiña en la cabellera requiere una medicina oral de un médico licenciado. La tiña en el cuerpo se puede tratar con una crema micótica aplicada directamente al área afectada y cubierto con una curita.
- ❑ Condición excepcional o atípica, física o emocional que prevendría a su hijo/a de participar cómodamente en clase

Gracias para su ayudar y coperación a mantener a todos estudiantes y personal de escuela sanos.